

پیوست ها

پیوست ۱ - فرم مشاوره‌ی پیش از آزمایش

نام مرکز: _____

کد مراجع: _____ تاریخ: _____

آزمایش قبلی HIV

تاریخ آخرین آزمایش: _____

نتیجه‌ی آزمایش: مثبت منفی نامشخص به خاطر ندارمآخرین آزمایش ظرف سه ماه از زمان رفتار و مواجهه‌ی پرخطر انجام شده است؟ بلی خیر

ارزیابی خطر

مراجع شریک ثابت جنسی دارد؟ بلی خیرآیا هیچ یک از شرکای ثابت فرد، HIV⁺ می‌باشد؟ بلی خیر نامشخص

در صورتی که مراجع خردسال می‌باشد:

وضعیت HIV مادر: مثبت منفی نامشخصوضعیت HIV پدر: مثبت منفی نامشخص

آیا در دوره‌ی نهفتگی قرار دارد؟	تاریخ آخرین بار	(در صورتی که خطر مواجهه وجود داشته، تیک بزنید)
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> مواجهه‌ی اتفاقی در محل کار
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> انواع خالکوبی و رفتارهای مشابه
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> عضو اهدایی، فرآورده‌های خونی
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> مقاربت واژینال
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> مقاربت دهانی
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> مقاربت مقعدی
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> وسایل تزریق مشترک

مراجع به دلیل دوره‌ی نهفتگی، نیاز به تکرار آزمایش دارد؟ بلی خیر

در صورت نیاز به تکرار، تاریخ آزمایش مجدد را مشخص نمایید. تاریخ: _____

مراجع حامله می‌باشد؟ بلی خیر
 همسر مراجع حامله می‌باشد؟ بلی خیر
 در صورت باردار بودن، در چه مرحله‌ای می‌باشد؟
 سه ماهه‌ی اول سه ماهه‌ی دوم سه ماهه‌ی سوم

مراجع از روش‌های جلوگیری از بارداری به صورت منظم استفاده می‌نماید؟ بلی خیر
 همسر مراجع از روش‌های جلوگیری از بارداری به صورت منظم استفاده می‌نماید؟ بلی خیر
 آیا نیاز به ارجاع به کلینیک تنظیم خانواده وجود دارد؟ بلی خیر

آیا مراجع تا به حال، بدون رضایت و به زور رابطه جنسی داشته است؟ بلی خیر
 آیا به این دلیل نیاز به ارجاع دارد؟ بلی خیر

آیا مراجع سابقه‌ی عفونت‌های آمیزشی دارد؟ بلی خیر
 آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟ بلی خیر
 آیا شریک جنسی مراجع، سابقه‌ی عفونت‌های آمیزشی دارد؟ بلی خیر
 آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟ بلی خیر

آیا مراجع سابقه‌ی سل دارد؟ بلی خیر
 آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟ بلی خیر
 آیا شریک مراجع، سابقه‌ی سل دارد؟ بلی خیر
 آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟ بلی خیر

شرح حال مختصری از سوابق پزشکی بیمار را ذکر نمایید (مانند هیپاتیت B یا C):

ارزیابی روشهای سازگاری

در صورت مثبت شدن نتیجه آزمایش، بیمار چگونه با این موضوع کنار خواهد آمد؟

آیا قصد اقدام به خودکشی دارد؟ بلی خیر
 آیا سابقه قبلی اقدام به خودکشی و یا صدمه به خود را دارد؟ بلی خیر

آیا قصد صدمه به دیگران را دارد؟ بلی خیر

آیا احتمال دارد در صورت افشا به فرد دیگری مورد خشونت یا آسیب قرار بگیرد؟ بلی خیر

آیا از طرف خانواده و یا اطرافیان حمایت و کمک کافی دریافت خواهد کرد؟ بلی خیر

چک لیست کنترل ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی پیش از آزمایش

- دلایل انجام آزمایش را با مراجع مطرح نمودم.
- آگاهی مراجع از HIV را ارزیابی و باورهای نادرست وی را اصلاح کردم.
- نتایج آزمایش و مفهوم دوره‌ی نهفتگی را برای مراجع توضیح دادم.
- رفتارهای پرخطر را ارزیابی کردم و توصیه‌های لازم در این خصوص را ارائه کردم.
- آموزش نحوه‌ی استفاده از کاندوم را ارائه دادم: (به صورت شفاهی مکتوب به صورت بروشور با نمایش و تمرین)
- کاندوم در اختیار مراجع قرار دادم (تعداد کاندوم‌های در اختیار گذاشته شده نزد مراجع: _____)
- آموزش پیشگیری از HIV در رابطه با مصرف مواد، ارائه دادم: (به صورت شفاهی مکتوب به صورت بروشور در مورد این مراجع لزومی نداشت)
- ظرفیت مراجع را برای سازگاری با نتیجه‌ی احتمالی مثبت ارزیابی کردم. می‌توان از مراجع پرسید «چنانچه نتیجه‌ی آزمایش مثبت شود، چه خواهد کرد؟» واکنش بیمار و عبارات وی را یادداشت نمایید.

- افکار خودکشی مراجع را ارزیابی و سابقه‌ی قبلی آسیب به خود یا خودکشی را بررسی کردم.
- افکار مراجع در خصوص قصد آسیب به دیگران را ارزیابی کردم.
- ضرورت افشا را با مراجع مطرح و منابع حمایتی وی را ارزیابی کردم.
- در صورت افشا نزد همسر، احتمال خشونت و پرخاش را ارزیابی کردم.
- منابع حمایتی مراجع را ارزیابی کردم.

یادداشت‌های اضافی:

امضای مشاور:

تاریخ:

امضای مراجع:

پیوست ۲ - فرم مشاوره‌ی پس از آزمایش

نام مرکز: _____ کد آزمایشگاه: _____

کد مراجع: _____ تاریخ انجام آزمایش: _____

- نتیجه‌ی آزمایش: منفی از نظر آنتی‌بادی HIV مثبت از نظر آنتی‌بادی HIV نامشخص
- نتیجه‌ی آزمایش را با مشخصات مراجع تطابق دادم.
- اطلاعات جلسه‌ی مشاوره‌ی پیش از آزمایش را با مراجع مرور کردم.
- نتیجه‌ی آزمایش را با بیان ساده به مراجع عنوان کردم.
- به مراجع برای هضم اطلاعات و نشان دادن واکنش، زمان دادم.

تنها جهت مراجعین HIV⁻

- نتیجه‌ی آزمایش را شرح دادم.
- از نظر دوره‌ی نهفتگی و سوء مصرف مواد، مراجع را ارزیابی کردم.
- به بیمار توصیه به آزمایش مجدد کردم.
- برای مراجع، مشاوره‌ی کاهش خطر را انجام دادم.
- مراجع را برای دریافت خدمات دیگر، ارجاع دادم.
- در صورت ارجاع، از مراجع جهت مطرح نمودن نتیجه‌ی آزمایش نزد همکاران، رضایت اخذ نمودم.

تنها جهت نتایج نامشخص

- در مورد احتمال این که آزمایش در دوره‌ی نهفتگی انجام شده، صحبت نمودم.
- بر اجتناب از مقاربت محافظت نشده و عدم استفاده از وسایل تزریق مشترک، اصرار ورزیدم.
- زمان آزمایش مجدد را تعیین نمودم.
- مشاوره‌ی کاهش استرس و حمایتی به عمل آوردم.

تنها جهت مراجعین HIV +

- پیش از مطلع نمودن مراجع، نتیجه‌ی آزمایش را چک کردم.
- آمادگی مراجع جهت دریافت نتیجه را ارزیابی نمودم.
- نتیجه‌ی آزمایش را تشریح کردم.
- در مورد پیگیری درمان و حمایت از مراجع، توضیح دادم.
- ظرفیت مراجع را برای مقابله و سازگاری را ارزیابی نمودم.
- خطر خودکشی را ارزیابی کردم.
- در مورد استراتژی‌های افشا نزد همسر، صحبت نمودم.
- از این که مراجع به سلامت به منزل می‌رسد، اطمینان حاصل کردم.

برنامه مقابله‌ای مراجع

- مراجع را برای سازگاری و مقابله طی ۴۸ ساعت آینده، یاری دادم.
- خطر خودکشی را ارزیابی کردم.
- در مورد روش‌های پیشگیری از انتقال صحبت نمودم.
- جزوات و اطلاعات IEC (اطلاعات، آموزش، ارتباط) را در اختیار مراجع قرار دادم.

ارجاع بیمار

- مراجع را جهت دریافت دیگر خدمات، ارجاع دادم.

جزئیات ارجاع:

نوع حمایت و پشتیبانی مورد نیاز

<input type="checkbox"/> مشاوره‌ی حمایتی مستمر <input type="checkbox"/> پشتیبانی پزشکی/درمانی <input type="checkbox"/> حمایت توسط گروه‌های همسان <input type="checkbox"/> پشتیبانی مالی <input type="checkbox"/> خدمات تخصصی بهداشت روان <input type="checkbox"/> سایر

- آموزش نحوه‌ی استفاده از کاندوم، ارائه شد: (به صورت شفاهی مکتوب به صورت بروشور با نمایش و تمرین)
- کاندوم در اختیار مراجع قرار گرفت (تعداد کاندوم‌های در اختیار گذاشته شده نزد مراجع: _____)
- آموزش پیشگیری از HIV در رابطه با مصرف مواد، ارائه شد: (به صورت شفاهی مکتوب به صورت بروشور در مورد این مراجع لزومی نداشت)

تاریخ جلسه‌ی مراجعه‌ی بعدی: _____

تاریخ

امضای مراجع

امضای مشاور

پیوست ۳- مصاحبه‌ی ارزیابی خطر خودکشی

صحبت در مورد خودکشی را با توجه به شرایط مراجع و با ظرافت به پیش بکشید. برای این منظور می‌توان از عبارتی که بیمار در جلسه‌ی مشاوره‌ی پیش از آزمایش مطرح نموده، استفاده کرد. سپس سئوالات زیر را از مراجع بپرسید:

- هر چند وقت یکبار به خودکشی فکر می‌کنید؟ □ گاهی اوقات □ بیشتر از روزی یکبار □ دائماً به خودکشی فکر می‌کنم
- این افکار معمولاً چه مدت طول می‌کشد؟ □ خیلی کوتاه □ گاهی بیش از یک ساعت □ تمام روز
- از مقیاس صفر تا ده، که صفر نشانه‌ی بهترین حال شما و ده نشانه‌ی افسرده‌ترین حال شماست، چه عددی معرف روحیه و خلق شما است؟
- آیا برای این کار نقشه‌ی خاصی هم دارید؟ □ بلی □ خیر
- آیا به روش آن هم فکر کردید؟ □ بلی □ خیر
- آیا به زمان انجام آن هم فکر کردید؟ □ بلی □ خیر
- آیا به مکان انجام آن هم فکر کردید؟ □ بلی □ خیر
- آیا برای این کار، وسایل لازم (مانند اسلحه، دارو و غیره) در دسترس شماست؟ □ بلی □ خیر
- آیا برای این کار، تمهیداتی (مانند نوشتن وصیت‌نامه، بخشیدن اموال و غیره) نیز اندیشیده‌اید؟ □ بلی □ خیر
- روابط شما با اطرافیان چگونه است؟ آیا از افراد خانواده و یا دوستان، کسی برای کمک در دسترس است؟ □ بلی □ خیر
- خلق و خو و روحیه‌ی شما این اواخر چطور بوده است؟ آیا روحیه‌ی شما این اواخر تغییر کرده است؟ □ بلی □ خیر
- آیا روحیه‌ی شما زیاد نوسان می‌کند؟ □ بلی □ خیر
- آیا اشتها‌ی شما این اواخر تغییر کرده است؟ □ بلی □ خیر
- آیا میل جنسی شما این اواخر تغییر کرده است؟ □ بلی □ خیر
- چه چیزی می‌تواند شما را از فکر کردن به خودکشی بازدارد؟

منابع

منابع اصلی^۱

- UNICEF, Family Health International, World Health Organization. HIV Counselling Handbook for the Asia-Pacific: UNICEF East Asia and Pacific Regional Office; 2009.
- World Health Organization. Guidance on Provider-Initiated HIV Testing & Counselling in Health Facilities. Geneva: WHO Publications; 2007.
- Cohen MA, Gorman JM. Comprehensive textbook of AIDS psychiatry. New York: Oxford University Press; 2008.
- بیان‌زاده س.ا، بیرشک ب، متقی‌پوری، بوالهروی ج، مشاوره در ایدز. تهران: واحد انتشارات انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز همکاری‌های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی؛ ۱۳۸۴.

سایر منابع

- Aldridge RW, Iglesias D, Caceres CF, Miranda JJ. Determining a cost effective intervention response to HIV/AIDS in Peru. BMC public health. 2009; 9: 352.
- Amin-Esmaeili M, Rahimi-Movaghar A, Haghdoost AA, Mohraz M. Evidence of HIV epidemics among non-injecting drug users in Iran: a systematic review. Addiction. 2012; 107(11): 1929-38.
- Catalan J, Harding R, Sibley E, Clucas C, Croome N, Sherr L. HIV infection and mental health: suicidal behaviour: systematic review. Psychol Health Med. 2011; 16(5): 588-611.
- Creese A, Floyd K, Alban A, Guinness L. Cost-effectiveness of HIV/AIDS interventions in Africa: a systematic review of the evidence. Lancet. 2002; 359(9318): 1635-43.
- Denison JA, O'Reilly KR, Schmid GP, Kennedy CE, Sweat MD. HIV voluntary counseling and testing and behavioral risk reduction in developing countries: a meta-analysis, 1990-2005. AIDS Behav. 2008; 12(3): 363-73.
- Kennedy CE, Medley AM, Sweat MD, O'Reilly KR. Behavioural interventions for HIV positive prevention in developing countries: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ. 2010; 88(8): 615-23.
- Minnie KS, van der Walt SJC, Klopper HC. A systematic review of counselling for HIV testing of pregnant women. J Clin Nurs. 2009; 18(13): 1827-41.

^۱ ترتیب منابع اصلی بر اساس میزان استفاده در تدوین این کتاب، آورده شده است.

- Painter TM. Voluntary counseling and testing for couples: a high-leverage intervention for HIV/AIDS prevention in sub-Saharan Africa. Soc Sci Med. 2001; 53(11): 1397-411.
 - Rely K, Bertozzi SM, Avila-Figueroa C, Guijarro MT. Cost-effectiveness of strategies to reduce mother-to-child HIV transmission in Mexico, a low-prevalence setting. Health Policy Plan. 2003; 18(3):290-8.
 - Steel G, Nwokike J, Joshi M. Development of a multi-method tool to measure ART adherence in resource-constrained settings: the South Africa experience. submitted to the U.S. agency for international development by the rational pharmaceutical management plus program. Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2007.
 - Sweat M, Gregorich S, Sangiwa G, Furlonge C, Balmer D, Kamenga C, et al. Cost-effectiveness of voluntary HIV-1 counselling and testing in reducing sexual transmission of HIV-1 in Kenya and Tanzania. Lancet. 2000; 356(9224): 113-21.
 - Teerawattananon Y, Vos T, Tangcharoensathien V, Mugford M. Cost-effectiveness of models for prevention of vertical HIV transmission-voluntary counseling and testing and choices of drug regimen. Cost Eff Resour Alloc. 2005; 3: 7.
 - The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2010. Geneva: WHO Library; 2010.
 - World Health Organization. A Handbook for Improving HIV Testing and Counselling Services; Field-test version. Geneva: WHO Publications; 2007.
 - Young TN, Arens FJ, Kennedy GE, Laurie JW, Rutherford G. Antiretroviral post-exposure prophylaxis (PEP) for occupational HIV exposure. Cochrane Database Syst Rev. 2007(1): CD002835.
- حاجی‌عبدالباقی م، سید علی‌نقی س.ع، زندیه س. راهنمای کاربردی مواجهه با اچ‌آی‌وی. ایدز. تهران: اوسانه؛ ۱۳۸۸.
- عباسی م. حقوق جزای پزشکی. تهران: انتشارات حقوق؛ ۱۳۸۸.
- کمیته علمی مراقبت و درمان بیماران مبتلا به HIV. ارزیابی بیمار مبتلا به HIV/AIDS و درمان ضد رتروویروسی در بزرگسالان و نوجوانان. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۹۰.
- کمیته علمی مراقبت و درمان بیماران مبتلا به HIV. دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۹۰.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. گزارش پیشرفت کنترل ایدز در جمهوری اسلامی ایران: در بارهٔ پایش اعلانیهٔ تعهد مصوب اجلاس ویژهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینهٔ اچ‌آی‌وی و ایدز. دبیرخانهٔ کارگروه کشوری ایدز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۹۰.

نمایه

۴, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۰۷.....	MSM	۹, ۱۱, ۱۲, ۲۸, ۴۸, ۵۰, ۵۲, ۵۷, ۶۱, ۷۳, ۷۵, ۹۹.....	AIDS
۴, ۳۹, ۱۱۹.....	NA	۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۴۶, ۵۱, ۵۵, ۵۸, ۵۹, ۸۷, ۸۸, ۸۹, ۹۰, ۹۱, ۹۲, ۹۳, ۹۵, ۱۲۰	ART
۴, ۸۷, ۸۸.....	NNRTI	۴, ۷۴.....	ASSIST
۴, ۸۷, ۸۸.....	NRTI	۴, ۳۸.....	BCC
۵۸.....	Opt-In	۴, ۱۰, ۱۴, ۱۶, ۷۳, ۸۷, ۹۴, ۱۲۰.....	CD4
۵۸.....	Opt-Out	۴, ۴۶, ۵۶.....	CICT
۴, ۱۵, ۱۶, ۵۵.....	PCP	۴, ۹۹.....	CRC
۴, ۲۰, ۲۲.....	PCR	۴, ۴۵, ۴۶.....	DALY
۴, ۱۱۹, ۱۲۰.....	PEP	۴, ۵۷.....	DIC
۴, ۸۸.....	PI	۴, ۸۷.....	DNA
۴, ۴۶, ۴۷, ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۵۹.....	PICT	۴, ۷۴.....	DSM-IV
۴, ۲۸.....	PLWHA	۴, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳.....	ELISA
۴, ۷۲.....	PTSD	۴, ۷۴.....	GHQ-28
۴, ۲۰, ۲۲.....	RIPA	۴, ۷۴.....	HADS
۴, ۷۴.....	SAMISS	۴, ۱۷, ۱۱۹.....	HBV
۴, ۱۸, ۷۷, ۸۰, ۸۱, ۸۴, ۱۱۰.....	STI	۴, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۱.....	HCT
۴, ۱۱, ۱۲, ۴۶, ۵۶.....	UNAIDS	۴, ۱۷, ۱۱۹.....	HCV
۴.....	UNGASS	۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۱, ۳۳, ۳۴, ۳۷, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۳, ۵۴, ۵۵, ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۵۹, ۶۱, ۶۲, ۶۳, ۶۴, ۶۶, ۶۷, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۷۹, ۸۰, ۸۱, ۸۲, ۸۳, ۸۹, ۹۰, ۹۱, ۹۳, ۹۴, ۹۵, ۹۶, ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۸, ۱۳۲, ۱۳۳, ۱۳۵, ۱۳۷, ۱۳۸, ۱۴۰, ۱۴۱	HIV
۴, ۴۶, ۴۷, ۵۶, ۵۹.....	VCT	۴, ۱۷.....	HPV
۴, ۱۱, ۱۵, ۵۶, ۷۴, ۸۵.....	WHO	۴, ۷۴, ۱۱۶.....	ICD-10
۴۵, ۱۲۰.....	اثر بخشی	۴.....	MARP
۸, ۱۰۸.....	اختلال هویت جنسی		
۵۰, ۶۲, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۵, ۹۰, ۹۱, ۱۳۹.....	اختلالات روانپزشکی		
۱۶, ۱۷, ۷۲.....	اختلالات نورولوژیک		
۷, ۱۵, ۱۷, ۲۷, ۳۰, ۴۰, ۵۰, ۵۴, ۵۵, ۵۶, ۵۹, ۶۷, ۶۸, ۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۸۱, ۸۴, ۸۵, ۹۲, ۹۴, ۹۵, ۹۸, ۱۰۶, ۱۰۸, ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۱۶, ۱۱۸, ۱۲۶, ۱۴۲, ۱۴۵, ۱۴۷, ۱۴۸	ارجاع		

- تزریق..... ۱۰۹، ۱۴۴، ۸۲، ۵۰، ۴۸، ۴۳، ۴۱، ۳۸، ۲۴، ۱۷، ۱۳، ۱۰، ۱۴۷
- تست‌های سریع..... ۲۰، ۲۳
- تشخیص قطعی..... ۱۱۶
- تصویرسازی..... ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۲۷
- تغییر رفتار..... ۴۶، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۲۸، ۲۶، ۱۸، ۷۲، ۷۳، ۸۳، ۱۰۲، ۱۱۴
- تکانشی..... ۶۴، ۶۱، ۲۶
- تن‌فروش..... ۱۲۷، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۳
- جلسه‌ی گروهی..... ۵۲
- چانه‌زنی..... ۱۲۴، ۱۱۲، ۱۱۰
- چک لیست..... ۴۷
- حذف خطر..... ۴۳
- حساسیت..... ۱۳۸، ۱۲۳، ۱۰۴، ۳۱، ۲۰، ۱۹
- حمایت اجتماعی..... ۱۲۸، ۱۰۲، ۸۰، ۶۳، ۵۱
- حمایت مالی..... ۷۴، ۷۲
- خشونت..... ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۰۷، ۱۰۱، ۸۲، ۶۵، ۵۹، ۵۸، ۳۳، ۱۴۶، ۱۴۰
- خودکشی..... ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۵۹، ۵۵، ۵۰، ۲۶، ۸، ۱۴۶، ۱۳۷، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۱۷، ۱۱۳، ۱۰۷، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۶۹، ۶۸، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰
- درمان..... ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۶، ۶۶، ۶۴، ۵۹، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۵، ۴۴، ۴۰، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱
- درمان ضد ویروسی..... ۱۵
- دوجنسگرا..... ۱۰۶، ۱۰۵
- دوجنسیتی..... ۱۰۹، ۱۰۸، ۸
- دوره‌ی نهفتگی..... ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۹، ۴۸، ۲۶، ۲۳، ۲۰، ۱۹، ۱۴، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۴، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۷، ۱۱۲، ۵۹، ۵۴
- رازداری..... ۱۰۰، ۸۵، ۸۲، ۷۷، ۶۷، ۶۵، ۵۹، ۵۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱
- رضایت..... ۵۸، ۵۶، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۶، ۱۴۵، ۱۲۴، ۱۲۰، ۱۱۵، ۱۰۹، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۵، ۷۶، ۶۷، ۵۹
- ۱۴۷
- ارزیابی خطر خودکشی..... ۱۴۹، ۶۵، ۶۳، ۶۲، ۶۱
- استرس شغلی..... ۱۳۸
- اعتیاد..... ۱۱۳، ۷۵، ۵۷
- افسردگی پس از زایمان..... ۹۷، ۹۶
- افشا ... ۸۹، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۷، ۷۳، ۶۷، ۵۹، ۵۸، ۵۶، ۵۵، ۱۴۸، ۱۴۶، ۱۳۵، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۹
- الکل ۷۲، ۷۱، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۵۵، ۵۰، ۴۸، ۳۸، ۳۷، ۲۹، ۱۷، ۸، ۱۲۷، ۱۱۸، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۰۷، ۹۵، ۹۱، ۹۰، ۷۷، ۷۴، ۷۳، ۱۴۰، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۸
- امتناع از آزمایش..... ۵۷
- انتقال..... ۴۲، ۳۸، ۳۸، ۲۶، ۲۵، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹، ۸۳، ۸۰، ۷۹، ۷۷، ۷۶، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۵۹، ۵۴، ۵۲، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۵، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۷، ۱۰۲، ۹۸، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۸۹، ۸۸، ۸۵، ۱۴۸، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲
- انتقال مادر به کودک..... ۱۱۹، ۹۶، ۹۴، ۹۳
- انگ..... ۱۰۷، ۱۰۳، ۱۰۲، ۹۸، ۹۶، ۹۴، ۸۰، ۷۱، ۶۳، ۵۷، ۵۶، ۲۷، ۱۱۴، ۱۳۸
- ایران..... ۱۳، ۱۲
- آرمیدگی..... ۱۴۱، ۱۴۰، ۷۷، ۴۱
- آزمایش تاییدی..... ۲۳
- آنتی‌بادی..... ۱۴۷، ۵۹، ۴۸، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۹
- آنتی‌ژن..... ۲۲، ۹
- بار ویروس..... ۱۲۰، ۹۴، ۸۱، ۲۳، ۱۶، ۱۱
- باردار..... ۱۴۵، ۱۲۰، ۹۶، ۹۴، ۹۳، ۷۶، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۸
- بررسی خطر..... ۴۹، ۴۷
- برقراری ارتباط..... ۱۱۰، ۱۰۴، ۹۹، ۶۵، ۶۴، ۴۷، ۳۵، ۲۲، ۱۱۲، ۱۳۹
- پایبندی..... ۸۸، ۸۷، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۵۱، ۴۰، ۳۸، ۲۷، ۲۵، ۱۷، ۸، ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۶، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹
- پرهیز..... ۱۴۱، ۱۲۳، ۷۹، ۵۰، ۴۳، ۴۲
- پسیکوز پس از زایمان..... ۹۸، ۹۷
- تبعیض..... ۹۹، ۹۸، ۹۴، ۷۶، ۷۳، ۷۱، ۶۳، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۳۱، ۲۷، ۱۰۹، ۱۰۳
- ترانس سکسوال..... ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۶

مراقبه ۱۴۱	رفتار پرخطر ۲۱, ۲۶, ۴۳, ۴۴, ۴۹, ۵۰, ۱۱۷
مرکز گذری ۵۷	روانی-اجتماعی ۶۳, ۷۱, ۷۲, ۹۲, ۹۷, ۹۸, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۳, ۱۱۹
مرحله‌ی آمادگی ۴۰	زبان بدنی ۳۳
مرحله‌ی پیش تأمل ۳۹	سازگاری ۲۶, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۶۳, ۸۳, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۴
مرحله‌ی تأمل ۳۹ ۱۱۳, ۱۱۷, ۱۲۵, ۱۴۶, ۱۴۸
مرحله‌ی تداوم ۴۰, ۴۲	سازمان جهانی بهداشت ۷, ۱۱, ۱۵, ۲۶, ۷۴, ۸۵
مرحله‌ی عمل ۴۰, ۴۲	سل ۱۴, ۱۶, ۱۷, ۴۶, ۵۵, ۵۶, ۵۷, ۷۷, ۹۱, ۹۸, ۱۴۵
مرگ ۱۲, ۱۶, ۲۷, ۳۰, ۳۳, ۳۷, ۶۳, ۶۴, ۶۹, ۷۳, ۸۷, ۱۰۰	سوء مصرف ۲۹, ۳۴, ۳۷, ۳۸, ۴۱, ۵۰, ۶۳, ۶۵, ۷۳, ۷۴, ۹۰
..... ۱۰۴, ۱۱۹, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۳ ۱۰۱, ۱۰۷, ۱۱۳, ۱۱۴, ۱۱۵, ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۴۷
مستند سازی ۶۴, ۶۵	سوغ ۸, ۷۱, ۷۳, ۷۴, ۱۱۸, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۰, ۱۳۲, ۱۳۳
مشاوره و آزمایش HIV ۷, ۴۵, ۴۶, ۴۷, ۵۷, ۹۸	سیستم ایمنی ۹, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۲۰, ۴۸, ۷۳, ۸۸
مشاوره و آزمایش داوطلبانه ۴۶, ۴۷	شیردهی ۱۰, ۲۹, ۸۰, ۹۳, ۹۴, ۹۵, ۹۶, ۱۱۹
مشاوره‌ی پایبندی ۸, ۸۷, ۹۱, ۹۳	عفونت اولیه ۷۳
مشاوره‌ی پس از آزمایش ۲۶, ۵۲, ۵۳, ۵۹, ۶۳, ۷۹, ۱۱۷, ...	عفونت حاد ۱۴, ۵۷, ۱۱۹
..... ۱۲۱, ۱۴۷	عفونت‌های آمیزشی .. ۹, ۱۰, ۱۷, ۱۸, ۴۲, ۴۵, ۴۸, ۴۹, ۵۵, ۵۷
مشاوره‌ی پیش از آزمایش ۲۶, ۴۷, ۵۱, ۵۲, ۵۴, ۵۸, ۵۹, ۶۲, ۷۶, ۷۹, ۸۴, ۹۱, ۱۰۶, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۹, ۱۴۵
..... ۷۹, ۱۱۶, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۴۴, ۱۴۷, ۱۴۹	عفونت‌های فرصت طلب ۱۰, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۵۵, ۹۱
مشاوره‌ی پیشگیری ۲۵, ۲۶	فرسودگی شغلی ۸, ۱۳۵, ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۳۸, ۱۳۹, ۱۴۰
مشاوره‌ی تغییر رفتار ۲۸, ۲۹, ۱۱۴	کاندوم ۱۳, ۲۷, ۳۳, ۳۵, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵, ۵۰, ...
مشاوره‌ی سوگ ۷۳, ۷۴, ۱۲۶, ۱۲۸, ۱۳۲ ۵۲, ۵۹, ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۴۶, ۱۴۹
مشاوره‌ی کودک ۱۰۰	کاهش آسیب ۷, ۲۶, ۴۳
مشاوره‌ی مراقبت ۷, ۷۱	کشت ویروس ۲۰, ۲۲
مصرف‌کننده‌ی تزریقی مواد ۱۱۱	کودک ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۸, ۲۳, ۲۷, ۷۷, ۹۳, ۹۴, ۹۵, ۹۶, ۹۷, ..
مقابله ۲۶, ۲۸, ۳۱, ۳۷, ۳۸, ۴۰, ۴۶, ۵۹, ۶۳, ۶۶, ۶۸, ۱۰۲, ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۰۷, ۱۱۹, ۱۲۷,
..... ۱۰۵, ۱۰۸, ۱۴۸ ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۲, ۱۳۳
مقاربت ۱۰, ۱۸, ۳۸, ۷۶, ۹۴, ۱۰۹, ۱۴۴, ۱۴۷	مبدل پوششی ۱۰۶, ۱۰۸
مقاربتی ۷	مثبت کاذب ۲۳, ۱۱۷
ملاحظات اخلاقی ۸۳, ۹۹	محرمانه ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۴۶, ۵۲, ۵۳, ۵۸, ۶۸, ۸۱, ۸۵, ۹۹,
منفی کاذب ۲۳ ۱۰۷, ۱۱۴
مواجهه ۱۰, ۲۰, ۲۱, ۹۵, ۹۸, ۱۰۷, ۱۱۲, ۱۱۷, ۱۱۹, ۱۲۰,	مداخلات درمانی ۶۶, ۷۳, ۱۰۴
..... ۱۲۵, ۱۳۳, ۱۴۴	مدیریت استرس ۱۴۰
مواجهه‌ی اتفاقی ۸, ۵۴, ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۴۴	مدیریت زمان ۱۴۰, ۱۴۱
	مراقب بیمار ۷۵

هیأتیت B ۱۶, ۱۷, ۱۴۵	موانع پایبندی ۹۱
هیأتیت C ۱۷	مهارت گوش دادن ۳۲
همجنسگرا ۱۱, ۱۰۵, ۱۰۶	مهارت‌های بین فردی ۳۰, ۱۱۲
همدلی ۳۱, ۴۰, ۷۵, ۱۲۶	نتیجه‌ی مثبت ۲۰, ۲۱, ۲۳, ۲۶, ۵۰, ۵۱, ۵۳, ۱۱۷, ۱۳۵
همه‌گیری ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۴۷, ۵۶, ۵۷	نوزاد ۱۱, ۲۰, ۲۳, ۹۳, ۹۶, ۱۲۸
یادبود ۱۳۰, ۱۳۲, ۱۳۳	وابستگی به مواد ۲۶, ۲۸, ۹۱, ۱۱۳, ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۸, ۱۱۹
یار درمان ۸۹	وسترن بلات ۲۰
	وفاق ۳۰, ۴۱